


تاریخ: 13:59:6 1400/06/01

شماره: ۰۰/۳۱/۵۶۰۰۵

پیوست: دارد

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
معاونت غذا و دارو

حج

سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

حج

ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان

ریاست محترم بیمارستانها

موسس و مسئول فنی محترم داروخانه

موضوع: هشدار مصرف قطره نفازولین جهت پیشگیری و درمان کووید ۱۹

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست نامه شماره 658 / 28726 مورخ 1400 / 05 / 27 مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور در خصوص هشدار مصرف قطره نفازولین جهت پیشگیری و درمان کووید 19 جهت استحضار و راهنمایی عموم مردم به حضور ارسال می گردد.

از طرف دکتر غلامرضا آهنی
معاونت غذا و دارو
دکتر علی راستی

شماره: ۶۵۸/۲۸۷۲۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
پیوست: دارد



معاونت های غذا و دارو سراسر کشور

موضوع: هشدار عدم استفاده از قطره نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-۱۹

با سلام و احترام؛

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس اطلاعات به دست آمده از طریق همکاران معاونت های غذا و دارو دانشگاه ها و دیگر منابع غیر رسمی، متأسفانه مطلع شدیم از طریق انتشار صدای ضبط شده یک فرد غیر گروه پزشکی در فضای مجازی، توصیه به مصرف قطره چشمی نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-۱۹ شده و ادعا شده است مصرف این دارو هیچ عارضه ای نخواهد داشت. با توجه به گسترش گزارشات غیر علمی مطرح شده در خصوص تاثیر داروهای آلفاگونیست های موضعی چشمی و بینی در پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-۱۹ در فضای مجازی که می تواند تبعات سنگینی برای سلامت جامعه داشته باشد، ضمن هشدار در زمینه عدم مصرف خودسرانه همه داروها خصوصاً قطره نفازولین در درمان کرونا، به پیوست اطلاعیه تهیه شده توسط این دفتر با عنوان هشدار در خصوص عدم استفاده از قطره نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-۱۹ خدمتتان ارسال می گردد.

لذا خواهشمند است ضمن انتقال اطلاعات یاد شده به مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم متبوع، پزشکان و داروسازان شاغل در آن دانشگاه، مراتب از طریق روابط عمومی دانشگاه و رسانه های جمعی اطلاع رسانی شود تا این باور اشتباه منجر به مصرف غیر منطقی دارو نفازولین و بروز عوارض دارویی برای هموطنان نگردد.

دکتر نوشین محمد حسینی
مدیر کل دفتر نظارت و پایش
مصرف فرآورده های سلامت محور

هشدار در خصوص عدم استفاده از قطره نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-19

در روزهای سخت اخیر که کشور با ابتلا و متاسفانه مرگ تعداد بسیار زیادی از هموطنانمان در اثر بیماری کووید-19 روبه رو می باشد و التزام آحاد جامعه به پیروی از درمان و دستورالعمل های دارویی تحت نظر گروه پزشکی نجات دهنده خواهد بود، متاسفانه مطلع شدیم از طریق انتشار صدای ضبط شده یک فرد غیر گروه پزشکی در فضای مجازی، توصیه به مصرف قطره چشمی نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-19 شده و ادعا شده است مصرف این دارو هیچ عارضه ای نخواهد داشت.

با توجه به گسترش این گزارشات غیر علمی مطرح شده در خصوص تاثیر داروهای آلفاگونیست های موضعی چشمی و بینی در پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-19 در فضای مجازی که می تواند تبعات سنگینی برای سلامت جامعه داشته باشد، ضمن هشدار در زمینه عدم مصرف خودسرانه همه داروها خصوصاً قطره نفازولین در درمان کرونا، توجه هموطنان را به نکات ذیل جلب می نمایم:

قطره ها و اسپری های بینی ضد گرفتگی یا احتقان (دکونژستانت) از جمله نفازولین، فنیل افرین و اکسی متازولین به صورت کوتاه مدت (حداکثر 3 روز) در رفع احتقان بینی ناشی از عفونت های تنفسی و یا آلرژی کاربرد دارند. قطره های چشمی ضد احتقان (دکونژستانت) شامل نفازولین و فنیل افرین زینک در رفع احتقان و قرمزی چشم ها در آلرژی های چشمی کاربرد دارد. همچنین از قطره چشمی فنیل افرین برای تشخیص بیماری های چشم به عنوان گشاد کننده مردمک استفاده می شود.

لازم به ذکر است استفاده از این داروها می تواند منجر به افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، گشاد شدن مردمک و حساسیت به نور، تشدید احتقان (مصرف بیش از 3 روز) و بی قراری شود. به علاوه استفاده از این داروها در جمعیت های خاص از جمله خانم های باردار و شیرده، بیماران دچار مشکلات قلبی عروقی مانند پرفشاری خون، سابقه سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد)، آنژین، گرفتگی عروق کرونر (آترواسکلروز)، مشکلات تیروئید (هایپرتیروئیدی)، بیماری های پروستات، افزایش فشار داخل چشم (گلوکوم) و افتادگی پلک (پتوز) باید تحت نظر پزشک باشد و در مواردی که خودسرانه استفاده شود می تواند برای بیماران مشکلات جدی را ایجاد نماید.

این داروها هیچ گونه اثر ضد ویروسی ندارند و هیچ شواهد علمی مبنی بر مفید بودن قطره ها و یا اسپری های بینی ضد احتقان (دکونژستانت) در پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-19 وجود ندارد. لذا استفاده از این داروها برای پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-19 توصیه نمی شود. تنها در مواردی که بیمار دچار احتقان بینی یا چشمی ناشی از بیماری کووید-19 شده باشد استفاده از داروهای ضد احتقان بینی یا

چشمی با دوز مناسب به صورت کوتاه مدت و تحت نظر پزشک می تواند به رفع علائم احتقان (گرفتگی بینی یا چشمی) کمک کند. بیماران مشکوک به عفونت کووید-19 باید توسط پزشک معالجه شوند و بررسی ها و درمانهای لازم بسته به شرایط بیمار انجام گردد.

لذا به هموطنان گرامی توصیه می شود جهت درمان هر نوع بیماری خصوصا کووید-19 ، ضمن مراجعه به پزشک، تنها به توصیه های متخصصین و همکاران گروه پزشکی و مطالب منتشر شده از طریق مراجع رسمی توجه نمایند و جهت حفظ سلامت خود از انجام اقدامات و انتشار مطالب بی پایه و اساس موجود در فضای مجازی جدا خودداری کنند.

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

سازمان غذا و دارو

مرداد ماه 1400